

院内用

はならびカウンセリング／治療開始時のご説明

こどものマウスピース矯正 インビザライン・ファースト



- 😊 治療中でも目立ちにくい
- 😊 食べたいものを食べたいときに！
- 😊 いつもの歯磨きで口腔内を健康に！
- 😊 スポーツや楽器の演奏も自由に！

インビザライン・ファーストで始める歯列矯正

Case 1 歯のガタガタが気になるお子様

Before



After



アライナー40 ステージ使用
性別／年齢：女性 9歳

6か月後

Case 2 歯のガタガタが気になるお子様

Before



After



アライナー52 ステージ使用
性別／年齢：女性 9歳
(+追加アライナー上下1回ずつ)

9か月後

Case 3 すきっ歯が気になるお子様

Before



After



アライナー38 ステージ使用
性別／年齢：男性 8歳
(+追加アライナー上下1回ずつ)

10か月後

Case 4 すきっ歯が気になるお子様

Before



After



アライナー24 ステージ使用
性別／年齢：男性 10歳

4か月後

Case 5 前歯が交叉しているお子様

Before



After



アライナー29 ステージ使用
性別／年齢：女性 7歳
(+追加アライナー上下1回ずつ)

9か月後

Case 6 前歯が交叉しているお子様

Before



After



アライナー22 ステージ使用
性別／年齢：男性 9歳

5か月後

Case 7 前歯の突出感が気になるお子様

Before



After



アライナー63 ステージ使用
性別／年齢：女性 11歳
(+追加アライナー上下1回ずつ)

18か月後

Case 8 前歯の突出感が気になるお子様

Before



After



アライナー47 ステージ使用
性別／年齢：男性 8歳

11か月後

Case 9 ディープバイトが気になるお子様

Before



After



アライナー96 ステージ使用
性別／年齢：女性 9歳
(+追加アライナー上下1回ずつ)

17か月後

Case 10 オープンバイトが気になるお子様

Before



After



アライナー36 ステージ使用
性別／年齢：男性 7歳
(+追加アライナー上下1回ずつ)

9か月後

※治療期間は患者様の歯列や口腔の状態により異なります。ここに掲載された期間を保証するものではなく、前後する場合もございます。

2 ※アライナー1ステージ当たりの装着期間は、患者様の歯列や口腔の状態によって異なります。歯科医師の指示に従ってください。

インビザライン・ファーストの特徴



治療中でも
目立ちにくい



いつも通りの
歯みがき習慣



不快感が
少ない¹



スポーツや楽器演奏も
いつも通り



食べ物の制限なし



緊急通院が少ない



治療期間を短縮²

アライナー使用方法

※歯科医師の指示に従ってください。

装着時間



20～22時間／1日

アライナーの
交換タイミング



1～2週間

交換するタイミング




就寝前

治療中に行う可能性のあること




エラスティック

アライナーや
ボタンに
専用のゴムを
かけることです



アタッチメント

歯に付ける
突起物のことです
アタッチメント



IPR

歯と歯の間に
必要な隙間を
作る為、歯間
隣接面を削る
ことです



萌出スペース

自然萌出する
歯のためにス
ペースを保持
することです



ポンティック

抜歯が必要な場合、
アライナーで空いた
スペースを埋めるこ
とができます

● 追加アライナーが必要な場合があります

追加アライナーとは、細部を調整する為に追加で治療計画を作成することです。
装着時間が足りない場合、必要になることがあります。

● 治療後には保定装置の装着が必要です

全てのアライナーの装着が終了した後、歯並びの後戻りを防ぐために、
保定用装置を装着する必要があります。主に、就寝時の装着をお勧めします。

成長過程の患者様のための早期治療

インビザライン・ファーストのアライナー

一部の小児患者様には1期治療と2期治療の両方が必要な場合があります。



お子様の口腔と身体の発育段階の
予測されるタイミングに合わせての治療が可能です。



1期治療のメリットとは？



歯並びを整えることで、笑顔を改善します



指しゃぶりや舌の突出癖などの習慣の改善をサポートします



2期治療がより短期に、より簡単になります



噛み合わせの問題が悪化することを防ぎます



おとなの歯が生えそろうためのスペースを作ります

アライナーの追加機能

➤ コンプライアンス・インジケーター

装着するにつれ青い丸が消えていくので、アライナーの装着推奨時間を守っているかがわかります。(有料オプション)



治療の流れ

1 初回相談


- ・スキャナーで歯型をとる
- ・もしくはシリコンで歯型をとる
- ・お顔と口腔内の写真を撮影
- ・相談後、治療をご希望の場合は、精密検査へ



2 精密検査の結果説明・治療契約

10～14日後

- ・治療ゴールの確認
- ・治療期間の確認
- ・注意事項のご説明とご契約



3 治療開始

2から
14日後以降

- ・アタッチメント*／IPR*の実施
- ・アライナーのお渡し
- ・使用方法のご説明

※アタッチメント…歯の表面に付ける突起物のことです。
※IPR…歯と歯の間に必要な隙間を作る為、歯間隣接面を削ることです。



4 患者様のご自宅にて、 1～2週間に一度アライナーの交換

治療開始後

※交換のタイミングについては、歯科医師の指示に従ってください。



5 モニタリング

定期的に

クリニックにて、
アライナーの適合を確認



6 保定

アライナー
治療終了後

- ・保定用装置をお渡し
- ・歯並びの後戻りを防ぐ

※保定装置の種類・価格については
歯科医師にご確認をお願いします。



治療開始時のご説明 —アライナーの使用方法—



お渡しする物

● アライナー



● アライナーケース



● アライナーチューイー



インビザライン・ファーストの使用の流れ

● 【使用例】 アライナー30ステージで、1週間交換の場合の流れ



*細部を調節する為などに、追加アライナーが必要な場合があります。
装着時間が足りない場合などに、必要になることがあります。



アライナー使用方法

装着時間



20～22時間／1日

アライナーの 交換タイミング



1～2週間

交換するタイミング




就寝前

*歯科医師の指示に従ってください
*紛失時や破損時に備えて、一つ前のアライナーは保管しておく



アライナーの着け方

- ・歯で噛んで入れない
- ・前歯→奥歯の順番で指ではめる
- ・より適合を良くするために、必ずアライナーチューイーを全体的に噛む



アライナーの外し方


- ・奥歯の口蓋側・舌側→前歯の順番で外す

＊前歯から外すと破損に繋がる可能性があります




お食事・お飲み物

- ・お食事の時は取り外す
- ・甘味／酸性／着色のある飲み物は避ける
- ・虫歯を防ぐため、飲食後、装着前は歯を磨く



アライナーの洗浄方法

- ・水かぬるま湯で歯ブラシを使用して洗う
- ・熱湯につけない
- ・洗浄剤を使用する



破損時・紛失時

- ・紛失時や破損時に備えて、一つ前のアライナーは保管しておく
- ・破損時・紛失時は、一つ前のアライナーを装着し、早めにクリニックに連絡する



追加アライナー

- ・細部を調整する為などに、追加アライナーが必要な場合がある
- ・装着時間が足りない場合などに、必要になることがある



インビザライン・ファーストのよくある質問



うちの子はアライナーを装着するでしょうか？

小児患者様の場合、アライナーの推奨装着時間を守る患者様が多い、ということに、87%のドクターが同意しています³。装着時間の経過とともに色が薄くなるコンプライアンス・インジケーター（有料オプション）を付けると、装着時間の管理に役立ちます。



歯の生えかわり時期が終わっていない場合は？

アライナーの設計にあたり、永久歯が入るためのスペースを設けます。
治療開始時期は歯科医師へご相談ください。



子供がアライナーをなくした場合は？

次のアライナーに進める場合もありますが、対応が異なる場合がありますので、歯科医師にご連絡ください。

1. David W. White, Katie C. Julien, Helder Jacob, Phillip M. Campbell and Peter H. Buschang. Discomfort associated with Invisalign and traditional brackets: A randomized, prospective trial. The Angle Orthodontist Nov 2017, Vol. 87, No. 6 pp. 801-808
2. 北米、EMEAおよびAPAC地域を含む限定導入(LMR)時の矯正歯科部門のインビザライン・ドクター54名と登録患者総数784名の調査に基づきます。LMRに参加した54名の矯正歯科部門のインビザライン・ドクターのうち31名から次の質問に対する回答を得ました：「以下の記述に対する同意の程度をスケールで教えてください：インビザライン・ファースト治療は、必要な装置の種類（歯列拡大装置や部分用ブレース装置等）が少ないため、患者様にとって便利である」。同意度のスケールは1～4、1は「強く反対する」、4は「強く同意する」としました。
3. 2020年12月から2021年3月に米国、カナダ、フランス、イタリア、スペイン、ブラジル、オーストラリア、中国、日本を含む、北米、EMEA、APAC地域で行われた世界規模の調査において、インビザライン・ドクター（矯正専門医）224名から次の質問に対する回答を得ました。「次の記述に対する同意の程度を教えてください：当クリニックでは、若年患者（6～10歳）のインビザライン・ファースト・アライナーの装着コンプライアンスは高い。」同意の程度は1から4の4段階で、1は「強く反対する」、4は「強く同意する」としました。86%が「強く同意する」または「同意する」と回答しました。自社調べ（2021年4月20日）



インビザライン・ジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル

© 2024 Align Technology, Inc. All rights reserved. Align, Invisalign, iTero, exocad, Viveraなどは、Align Technology, Inc. またはその子会社もしくは関連会社の商標および/またはサービスマークであり、米国および/またはその他の国において登録されています。